

予防接種（小児）のお知らせ（令和3年度）

お母さんから赤ちゃんにプレゼントした免疫（病気に対する抵抗力）は、自然に失われます。そのため、一定の時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫を作って病気を予防する必要があります。保育園や幼稚園に入るまでは予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように予防しましょう。



ホームページもあるよ！

種類	対象者(注1)	接種回数・間隔 & 注意事項	通知時期
BCG(結核)	1歳未満	1回(標準接種は生後5か月以上8か月未満)	
ロタウイルス	【ロタリックス:2回接種】 生後6週から24週の間	生後 1回目 2回目 生後 (1回目は生後14週6日まで) 6週 27日以上 24週	
	※令和2年8月1日以降に生まれた子が対象(経口接種)	【ロタテック:3回接種】 生後6週から32週の間	
		生後 1回目 2回目 3回目 生後 (1回目は生後14週6日まで) 6週 27日以上 27日以上 32週	
B型肝炎	1歳未満 (母子感染予防で生後接種を受けた子は除く。)	出生 1回目 2回目 3回目 1歳未満 27日以上 1回目接種から139日以上	生後2か月になるとき
ヒブワクチン、 小児用肺炎球菌ワクチン	生後2か月以上5歳未満	必要な接種回数は、初回接種時の年齢(月齢)によって変わります。(1~4回)	
4種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ混合)	生後3か月以上7歳6か月未満	1期初回(1回目) 1期初回(2回目) 1期初回(3回目) 1期追加 7歳6か月未満 生後3か月以上 20日以上 20日以上 6か月以上 DPT(三種混合)の接種を完了し不活化ポリオワクチンの接種が完了していない場合は引き続き不活化ポリオワクチンをお受けください。	生後2か月になるとき
水痘(みずぼうそう)	1歳以上3歳未満 (既に水痘にかかったことがある子は除く。)	1歳以上 1回目 2回目 3歳未満 3か月以上	1歳になるとき
MR (麻しん・風しん混合)	<1期> 1歳以上2歳未満 <2期> 小学校就学前年の1年間	各期:1回 ※MR定期接種を逃した以下の方も、無料で接種を受けられます。ただし、定期接種ではなく行政措置となるため、健康被害が発生した場合の救済制度が異なります。 ①2歳~MR2期対象学年前までの方でMR1期を未接種の方 ②小学校1年生相当~小学校6年生相当年齢までの方でMR未接種分がある方	<1期> 1歳になるとき <2期> 小学校入学前年の4月
DT (ジフテリア・破傷風混合)	11歳以上13歳未満	1回(標準接種は11歳以上12歳未満)	11歳になるとき
日本脳炎	<1期> 生後6か月以上7歳6か月未満 <2期> 9歳以上13歳未満	生後 1期初回(1回目) 1期初回(2回目) 1期追加 7歳6か月以上 9歳以上 2期 13歳未満 6か月以上 6か月以上	<1期> 3歳になるとき ★1期追加(4歳頃)の通知はありません <2期> 9歳になるとき (注2)
ヒトパピローマ (子宮頸がん)	小6から高1相当までの女子 (12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子)	<サーバリックス(2価)> ・2回目の接種は1回目の接種から1か月以上の間隔をおく ・3回目の接種は1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2年半以上の間隔をおく <ガーダシル(4価)> ・2回目の接種は1回目の接種から1か月以上の間隔をおく ・3回目の接種は2回目の接種から3か月以上の間隔をおく	対象者にハガキを送付 16歳になる年度の4月(注3)

(注1)対象者欄の「未満」とは、誕生日の前日までです。(例)1歳未満→1歳の誕生日の前日まで接種可能。
(注2)日本脳炎はハガキ形式での通知です。予診票はホームページからダウンロードしてお使いください。
(注3)ヒトパピローマはリーフレットを送付いたします。接種希望の方はホームページから予診票をダウンロードしてお使いください。

実施場所:各医療機関(裏面参照)

接種費用:無料(対象年齢の方のみ)

接種時に必要なもの:那覇市予診票、親子手帳

☆那覇市の予診票がお手元がない場合は、健康増進課までお問合せいただくか、市ホームページからダウンロードしてください。

☆予診票を自宅で記入しておく、診察がスムーズです◎

ご注意ください!!

間隔を守らずに接種した場合、自己負担になることがあります!!

他の予防接種との間隔

生ワクチン(注射)

MR(麻しん・風しん)/
水痘/BCG

27日以上あける
(接種した日の4週後の
同じ曜日から接種可能)

異なる
生ワクチン
(注射)接種

病気と予防接種の間隔

伝染性紅斑(りんご病)/
手足口病/突発性発疹/かぜ

治ってから
2週間以上あける

風しん(三日ばしか)/
おたふくかぜ/水痘

治ってから
2~4週間以上あける

麻しん(はしか)

治ってから
4週間以上あける

ワクチン
接種

※ひきつけ(けいれん)を起こしたことがある方、病気治療中の方は、接種前にかかりつけ医師とご相談ください。

●日本脳炎特例(接種の機会を逃した方への特例措置について)
・平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、左記の対象年齢を過ぎても20歳未満までは不足分の接種を受けられます。
・平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方で、7歳6か月未満までの間に1期(3回)未接種分がある場合、2期対象年齢内(9歳以上13歳未満)に1期不足分の接種を受けられます。

◆予防接種と副反応◆
現在日本で使用しているワクチンは、比較的副反応の頻度の少ないものです。しかし、体質は一人一人違うので、副反応が出る人もいます。予防接種後、心配な症状があるときは、直ちに接種した医療機関へご相談ください。