

●ヒブワクチン

【接種間隔・回数】

- (1) 初回接種の開始が生後 2 か月以上 7 か月未満の場合：**合計 4 回接種**
初回接種：3 回（27 日以上あける）※医師が必要と認めるときは 20 日以上
追加接種：1 回（3 回目の接種後 7 か月以上あける）
※初回接種 3 回目までは 1 歳未満までに終了させる。終了できない場合は、初回接種の残り回数分の接種は行わず、前回の接種から 27 日（医師が必要と認めるときは 20 日）以上あけて追加接種を行う。

- (2) 初回接種の開始が生後 7 か月以上 1 歳未満の場合：**合計 3 回接種**
初回接種：2 回（27 日以上あける）※医師が必要と認めるときは 20 日以上
追加接種：1 回（2 回目の接種後 7 か月以上あける）
※初回接種 2 回目までは 1 歳未満までに終了させる。終了できない場合は、初回接種 2 回目の接種は行わず、前回の接種から 27 日（医師が必要と認めるときは 20 日）以上あけて追加接種を行う。

- (3) 初回接種の開始が 1 歳以上 5 歳未満の場合：**1 回接種のみ**

●小児用肺炎球菌ワクチン

【接種間隔・回数】

- (1) 初回接種の開始が生後 2 か月以上 7 か月未満の場合：**合計 4 回接種**
初回接種：3 回（27 日以上あける）※医師が必要と認めるときは 20 日以上
追加接種：1 回（3 回目の接種後 60 日以上あけて 1 歳以降）
※初回接種 3 回目までは 2 歳未満までに終了させる。終了できない場合は、初回接種の残り回数分の接種は行わず、追加接種のみ行う。また、初回 2 回目が 1 歳を超えた場合は 3 回目は行わず、追加接種のみ行う。

- (2) 初回接種の開始が生後 7 か月以上 1 歳未満の場合：**合計 3 回接種**
初回接種：2 回（27 日以上あける）
追加接種：1 回（2 回目の接種後 60 日以上あけて 1 歳以降）
※初回接種 2 回目までは 2 歳未満までに終了させる。終了できない場合は、初回接種 2 回目の接種は行わず、追加接種を行う。

- (3) 初回接種の開始が 1 歳以上 5 歳未満の場合：**1 回接種のみ**